

OCU^hyl^C®

acu pilieni, šķīdums, bez konservantiem

1. Kas ir OCU^hyl^C un kādam nolūkam to lieto

OCU^hyl^C ir konservantus nesaturoši acu pilieni, šķīdums ar nātrija hialuronātu un samtenes ekstraktu. Tam piemīt mitrinoša, nomierinoša un ieeļļojoša iedarbība. Tā kā šī preparāta sastāvā ir hialuronskābe (viela, kas dabiski atrodas acī un citās ķermeņa daļās), šie acu pilieni efektīvi mazina sausuma un dedzināšanas sajūtu vai acu nogurumu un nodrošina ilgstošu komfortu. Samtenes ekstraktam piemīt aizsargājoša, pretiekaisuma un reģenerējoša iedarbība uz acs epitēliju.

OCU^hyl^C tiek izmantots samazinātas asaru rašanās gadījumā, lai mitrinātu, aizsargātu un eļļotu acu virsmu, un apstākļos, kas saistīti ar sausās acs simptomiem:

- sausās acs sindroms (asaru trūkums, dedzināšana, graušana, gaismas jūtība, svešķermeņa sajūta acī)
- radzenes ievainojums, radzenes erozija, radzenes ķirurģija
- hormonālās izmaiņas (menopauze)
- ilgstoša datora lietošana, ilga automašīnas vadīšana, tālsatiksmes lidojumi
- gaisa kondicionēšana, vējš, aukstums, sauss karstums, putekļi, dūmi, gaisa piesārņojums

OCU^hyl^C sastāvā nav konservantu, tāpēc šis līdzeklis ir ideāli piemērots kontaktlēcu lietotājiem un cilvēkiem ar jutīgām acīm.

OCU^hyl^C var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni.

2. Kas Jums jāzina pirms OCU^hyl^C lietošanas

Nelietojiet OCU^hyl^C, ja Jums ir alerģija pret kādu no šo zāļu sastāvā ietilpstošajām vielām.

Ja Jūs pašlaik lietojat citus acu līdzekļus, parasti ieteicams nogaidīt vismaz 5 minūtes starp dažādu līdzekļu lietošanu.

3. Kā lietot OCU^hyl^C


Parasti lieto 1 pilienu 1 līdz 3 reizes dienā; var lietot arī biežāk. OCU^hyl^C var lietot ilgstoši.

Kontaktlēcu lietotāji

OCU^hyl^C var lietot kontaktlēcu lietošanas laikā.

Piesardzības pasākumi pirms lietošanas

1. Nomazgājiet rokas un ērti apsēdieties vai stāviet.
2. Noskrūvējiet pudelītei vāciņu.



3. Turiet pudelīti uz leju starp īkšķi un citiem pirkstiem.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams izpilināt pirmo pilienu ārpus acs, uzmanīgi saspiežot pudelīti, jo, spiežot pudelīti spēcīgi un nevienmērīgi, var izdalīties lielāks šķīduma tilpums.
5. Ar pirkstu saudzīgi pavelciet uz leju bojātās acs apakšējo plakstiņu.




6. Novietojiet pipetes galu tuvu acij bet tā, lai tas nepieskartos acij vai tai pieguļošajām sejas daļām.
7. Saudzīgi saspiediet pudelīti, lai acī nokļūtu tikai 1 pilienš. Tad atlaidiet apakšējo plakstiņu un lēni aizveriet aci, lai OCU^hyl^C vienmērīgi izplatītos pa acs virsmu.
Priekš nākamā piliena ļaujiet gaisam ieplūst atpakaļ plastmasas pudelē, lai tā atgrieztos sākotnējā stāvoklī, un pēc tam turpiniet to lietot acij, kā ieteikts.

Lūdzam ņemt vērā, ka starp saspiešanu un piliena izdalīšanos var paiet dažas sekundes. Pudeli nedrīkst saspiest pārāk cieši.



8. Ja nepieciešams, procedūra jāatkārto ar otru aci.



9. Pēc lietošanas pudelīte vienu reizi jāsakrata uz leju, nepieskaroties pipetes galam, lai atbrīvotu pipeti no tajā atlikušā šķidruma. Tas nepieciešams tāpēc, lai nodrošinātu acu pilienu sterilitāti un nākamā piliena vieglāku iepilināšanu nākamajā lietošanas reizē.

10. Tūlīt pēc lietošanas cieši aizskrūvējiet pudelītes vāciņu.

4. Kādas ir iespējamās blakusparādības

Retos gadījumos tūlīt pēc lietošanas var būt jūtama viegla, pārejoša dedzināšanas sajūta vai alerģiska reakcija pret kādu no vielām, kas ir šī līdzekļa sastāvā.

Ja rodas jebkurš no šādiem simptomiem vai citas neparastas reakcijas, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

5. Ko OCU^{hyf}C satur

Nātrija hialuronāts, 1,2 mg uz 1 ml, Kliņģerītes ekstrakts, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kalcija hlorīda dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, nātrija citrāts, attīrīts ūdens.

6. Kā uzglabāt OCU^{hyf}C un cita informācija

Uzglabāt pudelīti oriģinālajā iepakojumā 25 °C temperatūrā.

Sargāt no aukstuma un sala.

Uzglabāt šo līdzekli bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot izstrādājumu pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz etiķetes vai kastītes blakus smilšu pulksteņa ikonai. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot OCU^{hyf}C pēc tam, kad kopš pudelītes atvēršanas pagājuši 3 mēneši.

Iepakojumu izmērs: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovākija

Tel.: +421 2 4333 3786

Fakss: +421 2 4363 8743

E-pasta adrese: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Šī lietošanas instrukcija pēdējoreiz atjaunināta 2020. gada aprīlis